UC Análise de Fenômenos Físicos da Natureza

Cinemática: velocidade média e velocidade instantânea e movimento retilíneo uniforme (MRU)

Prof. Simões

Objetivos dessa aula

- Identificar as diferenças entre cinemática, dinâmica e estática
- Entender os principais termos usados na cinemática
- Diferenciar velocidade média de instantânea
- Saber o que é o MRU
- Aplicar as funções matemáticas do MRU na resolução de problemas

Problema típico

- Dois trens A e B de 200 e 240 m de comprimento viajam em trilhos paralelos, em sentidos opostos, com velocidades de 18 km/h e 21,6 km/h respectivamente. Calcule o tempo decorrido entre os instantes inicial e final da passagem entre eles.

Áreas da mecânica

Cinemática

Dinâmica

Estática

Mecânica

Cinemática – definições e unidades no SI

- **Movimento retilíneo** – não são considerados os efeitos das curvas
- **Partícula** – os corpos são analisados como não tendo massa e dimensão
- **Deslocamento** – posição final menos inicial, independe da trajetória (m)

Cinemática – definições e unidades no SI

- **Distância percorrida** – medida da trajetória da posição inicial à final (m)
- **Velocidade** – taxa de variação do espaço percorrido (m/s)
 - Média
 - Instantânea
- **Aceleração** – taxa de variação da velocidade (m/s^2)

Cinemática – definições e unidades no SI

- **Movimento Retilíneo Uniforme**
 - velocidade constante, diferente de zero
 - aceleração igual a zero
- **Movimento Retilíneo Uniformemente Variado**
 - aceleração constante, diferente de zero
- **Movimento Retilíneo Variado**
 - velocidade não é constante
 - aceleração não é constante

Cinemática – definições, exemplo

Deslocamento:

Tempo decorrido:

Velocidade média:

Cinemática – definições, exemplo

Deslocamento: $\Delta x = x_2 - x_1 = 277 - 19 = 258$ m

Tempo decorrido: $\Delta t = t_2 - t_1 = 4,0 - 1,0 = 3,0$ s

Velocidade média: $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow v_m = \frac{258}{3,0} = 86 \frac{m}{s}$

Cinemática – definições, exemplo

Deslocamento:

Tempo decorrido:

Velocidade média:

Cinemática – definições, exemplo

Deslocamento: $\Delta x = x_2 - x_1 = 19 - 277 = -258$ m

Tempo decorrido: $\Delta t = t_2 - t_1 = 25 - 16 = 9,0$ s

Velocidade média: $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow v_m = \frac{-258}{9,0} = -29 \frac{m}{s}$

Velocidade média e velocidade instantânea

- Velocidade média (v_m)

- É a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo.
- É independente das variações que acontecem no caminho
- Exemplo: uma viagem de 70 km a São Paulo levou duas horas.
 - A velocidade média foi de 35 km/h
 - Muito provavelmente, ficou abaixo disso em congestionamentos e faróis, e acima disso em trechos livres

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{70}{2} = 35 \frac{km}{h}$$

Velocidade média e velocidade instantânea

- Velocidade instantânea (v)
 - É a velocidade média em um intervalo infinitesimal de tempo

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Lemos: é o limite da variação do espaço em relação a um intervalo de tempo, quando esse intervalo de tempo tende a zero.

Na prática, é, por exemplo, a velocidade assinalada no velocímetro do carro.

Velocidade média – significado geométrico

Velocidade média x velocidade instantânea

Unidades

- No Sistema Internacional
 - Velocidade: metros por segundo, m/s
- Muitos problemas apresentam a velocidade em km/h
 - Conversão:

$$1 \frac{km}{h} = 1 \frac{1000 m}{3600 s} \Rightarrow 1 \frac{km}{h} = 1 \cdot \frac{1000 m}{3600 s}$$
$$1 \frac{km}{h} = \frac{1 m}{3,6 s} \quad \text{ou} \quad 1 \frac{m}{s} = 3,6 \frac{km}{h}$$

- Para passar de km/h para m/s, dividimos por 3,6.
- Para passar de m/s para km/h, multiplicamos por 3,6.

Função horária da posição

- É a função que nos fornece a posição de um corpo a qualquer instante.
- Por exemplo, um corpo tem a seguinte função horária:

$$x(t) = 3t^2 + 2t$$

- Se quisermos saber qual sua posição no instante $t = 4 \text{ s}$, fazemos:

$$x(4) = 3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4$$

$$x(4) = 56 \text{ m}$$

Exemplo

Um corpo se desloca de acordo com a função $x(t) = t^3 - 2t^2 + 2$. Determine (a) seu deslocamento e (b) sua velocidade média entre os instantes 2 e 5 segundos.

Movimento Retilíneo Uniforme

- No MRU a velocidade é constante em toda a trajetória

[Simulador](https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man)

<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man>

Movimento Retilíneo Uniforme

- Se a velocidade for constante teremos que:

$$v_m = v$$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{x_2 - x_1}{\Delta t}$$

$$v \cdot \Delta t = x_2 - x_1$$

$$v \cdot \Delta t + x_1 = x_2$$

$$x_2 = x_1 + v\Delta t$$

Movimento Retilíneo Uniforme

- No MRU, o gráfico é sempre de uma reta, pois trata-se de uma função de primeiro grau, ou afim.

Compare:

$$f(x) = ax + b$$

$$x_2 = v\Delta t + x_1$$

ou:

$$x(t) = v \cdot t + x_1$$

Assim, temos que a velocidade é o coeficiente angular (inclinação) “a” da reta, e a posição inicial o coeficiente linear “b”.

Exemplo

Um corpo se move com velocidade constante de 12 m/s . No instante $t = 5,0 \text{ s}$ ele está na posição 25 m . Qual será sua posição quando $t = 15 \text{ s}$

Exemplo

Um engenheiro de produção analisa o movimento de uma correia transportadora. Ele verifica que, no instante $3,0\text{ s}$, o objeto chega ao primeiro operador, que está na posição a $4,5\text{ m}$ do início. No instante 15 s , o objeto chega ao terceiro operador, que fica a $22,5\text{ m}$ do início. Sabendo que o movimento da correia é constante, determine a equação horária de deslocamento, faça um esboço de seu gráfico, e determine em que momento o objeto chegará ao segundo operador, que está a $10,5\text{ m}$ do primeiro?

Exemplo

Um carro passa pelo quilômetro 35 de uma rodovia às 8h00, e às 9h30 chega a um posto que fica no km 125. Determine: (1) Qual foi sua velocidade média em km/h? E em m/s? (2) Qual a função horária de sua posição, assumindo que ele se desloca em MRU.

Exemplo

Um corpo A parte da posição $5,0 \text{ m}$ com velocidade constante de $1,5 \text{ m/s}$. No mesmo instante, um segundo corpo B parte da posição $0,80 \text{ m}$, com velocidade de $4,0 \text{ m/s}$. Pergunta-se: (a) em que momento eles se encontrarão? (b) Em que posição eles se encontrarão? (c) Qual o deslocamento total de cada um até o encontro? Faça um esboço do problema.

Exemplo

- Dois trens A e B de 200 e 240 m de comprimento viajam em trilhos paralelos, em sentidos opostos, com velocidades de 18 km/h e 21,6 km/h respectivamente. Calcule o tempo decorrido entre os instantes inicial e final da passagem entre eles.

Exercícios propostos

1. Um corpo leva 15 segundos para percorrer uma distância de 50 metros, com velocidade constante. Qual sua velocidade média? Resposta: $v = 3,33 \text{ m/s}$.
2. Um corpo mantém por 20 segundos uma velocidade constante de 50 m/s. Sabendo que ele partiu da posição 300 metros, qual sua posição final? Resposta: $x = 1300 \text{ m}$.
3. Um carro parte do km 5 de uma estrada, e segue com velocidade constante até o km 75, gastando 1h30min nesse percurso. Qual sua velocidade média em km/h e em m/s? Resposta: $v = 46,7 \text{ km/h} = 12,96 \text{ m/s}$.

Exercícios propostos

4. Um corpo A parte da posição 4 m com velocidade constante de 2 m/s. No mesmo instante, um segundo corpo B parte da posição 1 m, com velocidade de 5 m/s. Pergunta-se: (a) em que momento eles se encontrarão? (b) Em que posição eles se encontram? (c) Qual o deslocamento total de cada um até o encontro? Resposta: (a) $t = 1 \text{ s}$; (a) $x = 6 \text{ m}$; (b) $\Delta x_A = 2 \text{ m}$, $\Delta x_B = 5 \text{ m}$.
5. Dois carros se encontram no km 170 de uma rodovia. A velocidade do primeiro é de 30 km/h e do segundo é de 40 km/h, ambas constantes. O primeiro havia partido do km 50 da estrada. Qual foi a posição inicial do segundo? Resposta: $x = 10 \text{ km}$.
6. Num trecho de 300 km de estrada, um carro percorre os primeiros 100 km com velocidade constante de 60 km/h e os próximos 200 km com velocidade constante de 80 km/h. Qual foi a velocidade média no percurso dos 300 km? Resposta: $v = 72 \text{ km/h}$.

Obs.: exercícios 7 a 15 na lista postada.

Resumo

No movimento variado:

$v_m \Rightarrow$ *velocidade média*

$v \Rightarrow$ *velocidade instantânea*

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Função horária, exemplo $\Rightarrow x(t) = 3t^3 + 2t$

No movimento uniforme ($v_m = v$):

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$x_2 = x_1 + v\Delta t$$