Lei de Coulomb

q_1 $F_e = \frac{kq_1q_2}{r^2}$ q_2

r

UC Fenômenos elétricos, magnéticos e ondulatórios

**Ao final
dessa
aula, você
será capaz
de:**

Entender o significado da Lei de Coulomb

Comparar a atração elétrica com a força da gravidade

Aplicar matematicamente a Lei de Coulomb

Unir a Lei de Coulomb com o conceito de equilíbrio de cargas

Aplicar vetorialmente a Lei de Coulomb

Problema típico

Considere três cargas elétricas dispostas conforme gráfico abaixo. Calcule o módulo, a direção e o sentido da força resultante na carga q_3 situada na origem. As distâncias dos eixos estão em cm.

Lei de Coulomb

- Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) foi um engenheiro e físico francês que estudou as forças de atração e repulsão entre partículas carregadas eletricamente.
- Para isso ele usou uma balança de torção, inventada por Henry Cavendish (1731-1810) para medir a força gravitacional.

Lei de Coulomb

Seus testes mostraram que a força de atração (ou repulsão) entre corpos carregados segue uma lei parecida com a lei da Gravitação, de Newton:

Lei da gravitação:

$$F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}, \text{ onde } G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$$

Lei de Coulomb:

$$F = k \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}, \text{ onde } k = 8,99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

O valor de $k=8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ é válido para o vácuo, mas pode ser usado como boa aproximação para o ar. Para a maioria das situações práticas, pode ser arredondado para $9,0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Lei de Coulomb

O Coulomb é uma medida muito grande. Por exemplo, duas cargas opostas de 1,0 C cada, separadas por uma distância de 1 m exerceriam uma atração mútua de:

$$F = 8,99 \times 10^9 \frac{1 \times 1}{1} = 8,99 \times 10^9 \text{ N}$$

Esse valor corresponde ao peso produzido por uma massa de quase 1 milhão de toneladas¹:

$$P = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{8,99 \cdot 10^9}{9,81} = 9,16 \cdot 10^8 \text{ kg}$$

¹Aproximadamente 5 vezes a massa do maior navio do mundo, na época da confecção dessa apresentação (Oásis of the Seas).

Lei de Coulomb

- Os submúltiplos do Coulomb mais usados são:

$$1 \text{ milicoulomb} \rightarrow 1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}$$

$$1 \text{ microcoulomb} \rightarrow 1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$$

$$1 \text{ nanocoulomb} \rightarrow 1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$$

Aplicação

FORÇA ELÉTRICA VERSUS FORÇA GRAVITACIONAL Uma partícula α ('alfa') é o núcleo do átomo de hélio. Ela possui massa $m = 6,64 \times 10^{-27}$ kg e carga $q = +2e = 3,2 \times 10^{-19}$ C. Compare a força de repulsão elétrica entre duas partículas α com a força de atração gravitacional entre elas.

Aplicação: duas cargas

Duas cargas puntiformes, $q_1 = 1,0 \text{ nC}$ e $q_2 = -3,0 \text{ nC}$ estão separadas por um distância de $3,0 \text{ cm}$. Determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica entre as cargas.

Aplicação: 3 cargas alinhadas (caso 1)

Três cargas estão alinhadas e posicionadas sobre o eixo x , sendo que a carga situada na origem possui $q_3 = 5,0 \text{ nC}$. Na posição $x = 2,0 \text{ cm}$, encontra-se uma carga $q_1 = 1,0 \text{ nC}$ e na posição $x = 4,0 \text{ cm}$ está a carga $q_2 = -3,0 \text{ nC}$. Calcule o módulo, a direção e o sentido da força elétrica resultante sobre a carga q_3 .

Aplicação: 3 cargas alinhadas (caso 2)

Três cargas serão alinhadas e posicionadas sobre o eixo x , sendo que a carga situada na origem possui $q_3 = 5,0 \mu\text{C}$. Na posição $x = 4,0 \text{ cm}$ está a carga $q_2 = -3,0 \mu\text{C}$. No eixo x será colocada uma carga q_1 . Calcule a posição da carga q_1 (não representada) de modo que a resultante das forças sobre ela seja nula.

Aplicação: 3 cargas não alinhadas

Considere que as cargas do exemplo anterior estejam agora dispostas conforme gráfico abaixo. Calcule o módulo, a direção e o sentido da força resultante na carga q_3 situada na origem. As distâncias dos eixos estão em cm.

Conversão de retangulares para polares

Exemplo 1: Representar o ponto definido pelas coordenadas polares ($r = 4$, $\theta = 30^\circ$) em coordenadas retangulares (x , y). (Deg)

$$x = 3.464101615 \quad \text{[SHIFT] [Rec] 4 [,] 30 [)] [=]}$$
$$y = 2 \quad \text{[RCL] [F]}$$

Pressione [RCL] [E] para exibir o valor de x ou pressione [RCL] [F] para exibir o valor de y .

Exemplo 2: Representar o ponto definido pelas coordenadas retangulares (2 , $\sqrt{5}$) em coordenadas polares (r , θ). (Rad)

$$r = 3 \quad \text{[Pol] 2 [,] [√] 5 [)] [=]}$$
$$\theta = 0.84106867 \quad \text{[RCL] [F]}$$

Pressione [RCL] [E] para exibir o valor de r ou pressione [RCL] [F] para exibir o valor de θ .

Aplicação: resolução com a calculadora

Na mesma disposição do exemplo, calcule a força resultante nas cargas q_1 e q_2 .

Aplicação

- Respostas (mN)

Exercício 1

Duas partículas, A e B , eletricamente carregadas com quantidades de cargas elétricas, respectivamente iguais a $Q_A = 6,0 \mu\text{C}$ e $Q_B = -4,0 \mu\text{C}$, estão no vácuo, separadas pela distância de $3,0 \text{ mm}$. Sendo dada a constante eletrostática do vácuo igual a $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$, determine a intensidade da força elétrica de atração entre essas duas partículas nas condições acima.

Resposta: $|\vec{F}| = 2,4 \cdot 10^4 \text{ N}$

Exercício 2

Duas cargas iguais $q_1 = q_2 = 2,0 \mu\text{C}$ estão dispostas conforme o diagrama abaixo. Determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica total que essas cargas exercem sobre a carga $Q = 4,0 \mu\text{C}$, sobre o eixo x , na posição indicada.

Resposta: $\vec{F} = 0,461 \hat{i} \text{ N}$

Exercício 3

Duas partículas, A e B, eletrizadas com cargas $Q_A = 6 \text{ mC}$ e $Q_B = 8 \text{ mC}$, estão fixas, no vácuo, como esquematizado na figura a seguir. Calcule, em newtons, a intensidade da resultante das forças elétricas que essas partículas exercem em uma partícula C, eletrizada com carga $Q_C = 2 \text{ mC}$, quando abandonada no ponto C. É dada a constante eletrostática do vácuo, $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ (N} \cdot \text{m}^2)/\text{C}^2$.

Respostas:

$$\vec{F}_A = 2,6 \cdot 10^8 \text{ N}; \theta = 122^\circ$$

$$\vec{F}_B = 2,5 \cdot 10^8 \text{ N}; \theta = -23,5^\circ$$

$$\vec{F}_C = 1,5 \cdot 10^8 \text{ N}; \theta = 233^\circ$$

**Ao final
dessa
aula, você
deve ser
capaz de:**

Entender o significado da Lei de Coulomb

Comparar a atração elétrica com a força da gravidade

Aplicar matematicamente a Lei de Coulomb

Unir a Lei de Coulomb com o conceito de equilíbrio de cargas

Aplicar vetorialmente a Lei de Coulomb